

Avifauna autoctona

Nome scientifico	Nome comune
<i>Casmerodius albus</i> Linnaeus, 1758	Airone bianco maggiore
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Airone cenerino
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Airone guardabuoi
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Airone rosso
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Albanella minore
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Albanella reale
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Allodola
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Alzavola
<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aquila minore
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Averla maggiore
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Averla piccola
<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Balestruccio
<i>Ficedula hypoleuca</i> Pallas, 1764	Balia nera
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Ballerina bianca
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Ballerina gialla
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Barbagianni
<i>Haematopus ostralegus</i> , Linnaeus 1758	Beccaccia di mare
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Beccaccino
<i>Sylvia borin</i> , Boddaert 1783	Beccafico
<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Beccamoschino
<i>Sylvia curruca</i> Linnaeus, 1758	Bigiarella
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canapiglia
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Canapino
<i>Hippolais icterina</i> Vieillot, 1817	Canapino maggiore
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> Herman, 1804	Cannaiola comune
<i>Acrocephalus palustris</i> Bechstein, 1798	Cannaiola verdognola
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> Linnaeus, 1758	Cannareccione
<i>Sylvia atricapilla</i> Linnaeus, 1758	Capinera
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Cardellino
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Cavaliere d'Italia
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Cesena
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Chiurlo maggiore
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cicogna bianca
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cicogna nera
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	Cigno reale
<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Cincia dal ciuffo
<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Cincia mora
<i>Cyanistes caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Cinciallegra
<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Cinciarella
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Civetta
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Codibugnolo
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> Linnaeus, 1758	Codiroso comune
<i>Phoenicurus ochrurus</i> Gmelin, 1789	Codiroso spazzacamino
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Codone
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Colombaccio
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Colombella
<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattente
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Cormorano
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Cornacchia grigia
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Corriere grosso
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Corriere piccolo
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corvo comune
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Cuculo
<i>Motacilla flava</i> Pallas, 1776	Cutrettola
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Fagiano comune
<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Falco cuculo
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco di palude
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco pecchiaiolo
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Falco pellegrino
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco pescatore
<i>Carduelis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Fanello
<i>Regulus ignicapillus</i> Temminck, 1820	Fiorrancino
<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Fischione
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Fistione turco
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Folaga
<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Forapaglie castagnolo
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> Linnaeus, 1758	Forapaglie comune
<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Fraticello
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Fringuello
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Frosone
<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	Gabbianello
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Gabbiano comune
<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Gabbiano reale
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinella d'acqua
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Garzetta
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Gavina
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Gazza
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Germano reale
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Gheppio
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Ghiandaia
<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Gru
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Gruccione
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Gufo comune
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Lodolaio
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucherino
<i>Phylloscopus bonelli</i> Vieillot, 1819	Lui bianco
<i>Phylloscopus trochilus</i> Linnaeus, 1758	Lui grosso
<i>Phylloscopus collybita</i> Vieillot, 1817	Lui piccolo

Nome scientifico	Nome comune
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> Bechstein, 1795	Lui verde
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin pescatore
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Marzaiola
<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merlo dal collare
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merlo
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Mestolone
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Migliarino di palude
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Mignattino comune
<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	Mignattino piombato
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Moretta
<i>Aythya nyroca</i> (Guldenstadt, 1770)	Moretta tabaccata
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Moriglione
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Nibbio bruno
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Nibbio reale
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Nitticora
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oca selvatica
<i>Sylvia melanocephala</i> Gmelin, 1789	Occhiocotto
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Pantana
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Passera europea
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Passera mattugia
<i>Prunella modularis</i> Linnaeus, 1758	Passera scopaiola
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Pavoncella
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Pendolino
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Peppola
<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Pesciaiola
<i>Luscinia svecica</i> Linnaeus, 1758	Pettazzurro
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Pettirosso
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Picchio rosso maggiore
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Picchio verde
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Piccione selvatico
<i>Muscicapa striata</i> Pallas, 1764	Pigliamosche
<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Piro piro boschereccio
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Piro piro culbianco
<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Piro piro piccolo
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pispola
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Piviere dorato
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Poiana
<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Poiana calzata
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Porciglione
<i>Anthus trivialis</i> Linnaeus, 1758	Prispolone
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Quaglia comune
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Regolo
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Rigogolo
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Rondine
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Rondone comune
<i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Rondone maggiore
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Salciaiola
<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Saltimpalo
<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Schiribilla grigiata
<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Schiribilla
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Scricciolo
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Sgarza ciuffetto
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Smergo maggiore
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Smergo minore
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Smeriglio
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Sparviere
<i>Anthus spinoletta</i> Linnaeus, 1758	Spioncello
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Starna
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterna comune
<i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770	Sterna maggiore
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Sterna zampenere
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Sterpazzola
<i>Saxicola rubetra</i> Linnaeus, 1758	Stiaccino
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Storno
<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Strolaga mezzana
<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Strolaga minore
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Succiacapre
<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Svasso collarosso
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Svasso maggiore
<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, CL, 1831	Svasso piccolo
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Taccola
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarabusino
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Tarabuso
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Topino
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcicollo
<i>Turdus philomelos</i> Brehm, CL, 1831	Tordo bottaccio
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1758	Tordo sassello
<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	Tortora dal collare
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tortora selvatica
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Totano moro
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Tuffetto
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Upupa
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Usignolo di fiume
<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, 1831	Usignolo
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdone
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Verzellino
<i>Tadorna tadorna</i> Linnaeus, 1758	Volpoca
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Voltolino

Avifauna esotica

Nome scientifico	Nome comune
<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	Oca Indiana
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus, 1766)	Oca del Nilo
<i>Nymphicus hollandicus</i> Kerr, 1792	Calopsitta
<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Parrocchetto dal collare
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	Ibis sacro




COMUNE DI PEGOGNAGA

ORNITOFAUNA

(deliberazione della giunta regionale del febbraio 1991 - n. 4/51876)

Parco locale di interesse sovracomunale

Parco San Lorenzo



PER INFORMAZIONI E VISITE

Comune di Pegognaga *Ufficio Ecologia*

piazza Matteotti, 1 | tel. 0376 5546220 | fax 0376 5546229

infoparco@comune.pegognaga.mn.it



Testi: Daniele Cuizzi, Marco Simonazzi (Studio Eureco). Fotografie: Maurino Borghi, Nunzio Grattini, Vittorio Negrelli, Nunzio Truzzi - Coordinamento scientifico: Daniele Cuizzi (Studio Eureco) - Stampato su carta Revive Pure Natural con fibre riciclate al 100% di origine europea, senza utilizzo di cloro (TCF). Carta certificata Eu Flower e Blue Angel. (Settembre 2011)

Fonti:

Longhi D., Grattini N., 2009. Monitoraggio delle specie nidificanti e svernanti all'interno del PLIS San Lorenzo. Relazione tecnico scientifica anno 2009. Gruppo Ricerche Avifauna Mantovano - G. RAM.

Si desidera ringraziare il signor Nunzio Grattini per aver reso possibile la check-list dell'avifauna del Parco San Lorenzo, frutto di oltre vent'anni di osservazioni.

Il Parco San Lorenzo rappresenta una delle aree più interessanti per l'avifauna dell'Oltrepò mantovano e, più in generale, della provincia di Mantova. Sin dal 1986 essa è oggetto di indagini che hanno accertato la presenza di 181 specie di uccelli, di cui 35 nidificanti, 46 svernanti regolari e 5 esotiche, con un numero totale di individui oscillante tra i 2000 e i 3000 all'anno. La comunità ornitica risulta variamente distribuita nei principali habitat del Parco (formazioni arboree, fasce a canneto, margini dei terreni agricoli e costruzioni rurali) con una netta predilezione per le fasce boscate dell'Oasi Falconiera che ospitano più dell'80% delle coppie nidificanti e oltre il 50% delle specie. Nell'Oasi ritroviamo un ecosistema diversificato che garantisce la compresenza di ambienti idonei alla nidificazione, alla sosta e all'alimentazione degli uccelli che qui beneficiano inoltre di una gestione improntata alla minimizzazione delle fonti di disturbo, attraverso una severa regolamentazione degli accessi. La concomitanza di questi fattori giustifica la ricchezza di specie nidificanti e il consistente numero di coppie presenti, rappresentate in grande prevalenza da ardeidi. L'Oasi Falconiera ospita infatti una delle più importanti garzaie della provincia di Mantova, nella quale coesistono specie differenti quali Garzette, Nitticore, Aironi guardabuoi e Aironi cenerini. In particolare i contingenti di Airone guardabuoi e Nitticore sono numericamente rilevanti (superando in alcune annate le cento coppie per ciascuna specie), ma degna di nota è anche la presenza costante in periodo riproduttivo di un altro ardeide, non gregario, in forte contrazione in tutto il nord Italia: il Tarabusino. Accanto alle specie nidificanti, l'Oasi ospita notevoli contingenti di uccelli svernanti tra cui il Germano reale (oltre 500 unità) e il Colombaraccio (oltre 100 unità) e i dormitori di Cormorano (oltre 400 unità), Airone guardabuoi (oltre 300 unità) e Airone bianco maggiore (oltre 30 unità). Nelle fasce a canneto, anch'esse prevalentemente racchiuse nell'Oasi Falconiera, trovano il loro habitat riproduttivo uccelli come la Cannaiola comune, la Cannaiola verdognola, lo Svasso maggiore e il Tuffetto. In totale i canneti ospitano oltre il 20% delle specie nidificanti complessivamente presenti nel Parco. Degno di nota è anche il ruolo svolto nei confronti dell'avifauna dagli edifici posti all'interno o in prossimità del Parco, utilizzati da più del 10% delle coppie nidificanti complessivamente presenti nell'area protetta, costituite in gran parte da rondini e rondoni. Si segnalano infine alcune specie tutelate o rare nel territorio dell'Oltrepò mantovano, contattate presso il Parco San Lorenzo in oltre un ventennio di osservazioni: Falco di palude, Falco pescatore, Falco pellegrino, Albanella reale, Smergo minore, Smergo maggiore, Moretta, Moretta tabaccata, Me-stolone, Tarabusino, Strolaga minore e Strolaga mezzana, Averla piccola. Dal 2006 nell'Oasi Falconiera è attiva una stazione di inanellamento a scopo scientifico ufficialmente riconosciuta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica).